





















	ESPÈCES	INTÉRIEUR	EXTÉRIEUR	RISQUES NÉGLIGEABLES	RISQUES POSSIBLES	DÉTAILS
	Araignées	X	X	X		
	Blattes (coquerelles)	X			X	Maladies Réactions allergiques
	Centipèdes Millipèdes	X	X	X		
	Cloportes	X	X	X		
	Dermestes du lard	X			X	Présence de cadavres ou nourritures mal entreposées

	ESPÈCES	INTÉRIEUR	EXTÉRIEUR	RISQUES NÉGLIGEABLES	RISQUES POSSIBLES	DÉTAILS
	Drosophiles	X		X		
	Fourmis charpentières	X	X		X	Détériorations matérielles et alimentaires
	Fourmis de sable	X	X	X		
	Fourmis pharaons	X			X	Détériorations alimentaires
	Guêpes Frelons	X	X		X	Réactions allergiques

	ESPÈCES	INTÉRIEUR	EXTÉRIEUR	RISQUES NÉGLIGEABLES	RISQUES POSSIBLES	DÉTAILS
	Lépismes argentés Thermobies	X	X	X		
	Mouches domestiques Coccinelles	X	X		X	Peuvent attirer les dermestes du lard
	Moustiques Simulies		X	X		
	Perce-oreilles	X	X	X		
	Puces	X	X		X	Réactions allergiques

	ESPÈCES	INTÉRIEUR	EXTÉRIEUR	RISQUES NÉGLIGEABLES	RISQUES POSSIBLES	DÉTAILS
	Punaises de lits	X			X	Réactions allergiques
	Pyrales indiennes	X	X		X	Détériorations alimentaires Perte de production
	Scarabés japonais/du rosier		X		X	Ravages des plantes et fleurs
	Teignes des vêtements	X			X	Réactions allergiques
	Ténébrions		X		X	Détériorations alimentaires Perte de production dans les élevages Maladies/Allergies