





















	ESPÈCES	INTÉRIEUR	EXTÉRIEUR	RISQUES NÉGLIGEABLES	RISQUES POSSIBLES	DÉTAILS
	Araignée	X	X	X		
	Blatte (coquerelle)	X			X	Maladies Réactions allergiques
	Centipède Millipède	X	X	X		
	Cloporte	X	X	X		
	Dermeste du lard	X			X	Présence de cadavres ou nourritures mal entreposées

	ESPÈCES	INTÉRIEUR	EXTÉRIEUR	RISQUES NÉGLIGEABLES	RISQUES POSSIBLES	DÉTAILS
	Drosophile	X		X		
	Fourmi charpentière	X	X		X	Détériorations matérielles et alimentaires
	Fourmi de sable	X	X	X		
	Fourmi pharaons	X			X	Détériorations alimentaires
	Guêpe Frelon	X	X		X	Réactions allergiques

	ESPÈCES	INTÉRIEUR	EXTÉRIEUR	RISQUES NÉGLIGEABLES	RISQUES POSSIBLES	DÉTAILS
	Lépisme argenté Thermobie	X	X	X		
	Mouche domestique Coccinelle	X	X		X	Peuvent attirer les dermestes du lard
	Moustique Simulie		X	X		
	Perce-oreille	X	X	X		
	Puce	X	X		X	Réactions allergiques

	ESPÈCES	INTÉRIEUR	EXTÉRIEUR	RISQUES NÉGLIGEABLES	RISQUES POSSIBLES	DÉTAILS
	Punaise de lit	X			X	Réactions allergiques
	Pyrale indienne	X	X		X	Détériorations alimentaires Perte de production
	Scarabé japonais/du rosier		X		X	Ravages des plantes et fleurs
	Teigne des vêtements	X			X	Réactions allergiques
	Ténébrion		X		X	Détériorations alimentaires Perte de production dans les élevages Maladies/Allergies